

Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания животных – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»



Панюшкин Д.Е.

ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ В РАЦИОНАХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Состав полнорационного комбикорма для цыплят-бройлеров 16-26 день (Рост), %

	Контроль	Опыт
Пшеница	23,40	23,40
Кукуруза	28,31	28,33
Горох	3,0	3,0
Горох экструдированный	10,0	10,0
Жмых соевый сп 42	3,90	3,90
Шрот соевый сп 46%	9,34	9,34
Жмых подсолнечный	8,60	8,60
Жмых кукурузный	5,50	5,50
Кукурузный глютен	0,50	0,50
Мука мясо-перьевая сп 50%	1,0	1,0
Масло соевое	1,95	1,95
Монохлоргидрат лизина 98%	0,04	0,04
DL-метионин 98,5%	0,07	0,07
L-треонин 98%	0,07	0,07
Монокальцийфосфат	0,85	0,85
Известняковая мука	0,57	0,57
Кемзайм плюс	0,05	0,05
Холин хлорид 60%	0,17	0,17
Токсаут SP +	0,10	0,10
Бутиперл	0,03	0,03
П-5 рост 2.5%	2,50	2,50

Состав полнорационного комбикорма для цыплят-бройлеров с 27 дня (Финиш), %

	Контроль	Опыт
Пшеница	37,30	37,30
Кукуруза	19,68	19,70
Горох	6,10	6,10
Горох экструдированный	5,0	5,0
Жмых соевый сп 42	7,34	7,34
Жмых подсолнечный	9,40	9,40
Жмых кукурузный	4,60	4,60
Мука мясо-перьевая сп 50%	3,50	3,50
Масло соевое	3,10	3,10
Монохлоргидрат лизина 98%	0,05	0,05
L-треонин 98%	0,08	0,08
Монокальцийфосфат	0,45	0,45
Известняковая мука	0,43	0,43
Калия карбонат	0,12	0,12
Кемзайм плюс	0,05	0,05
Холин хлорид 60%	0,12	0,12
Токсаут SP +	0,10	0,10
Аскорбиновая кислота	0,02	0,02
Бутиперл	0,02	0,02
П-6 финиш 2.5%	2,50	2,50

Результаты выращивания цыплят-бройлеров

Возраст	Сохранность, %	Вес 1 гол, г	С/сут. привес	Конверсия корма	Поедаемость комбикорма, %
Контрольная группа					
16	100	512			
20	100	703	38,2	1,7	95
25	100	1009	61,2	1,74	84
30	100	1316	61,4	1,75	79
35	98	1620	60,8	1,79	72
40	98	1954	66,8	1,8	69
Опытная группа					
16	100	508			
20	100	690	36,4	1,69	94
25	100	970	56,1	1,71	91
30	100	1295	65,2	1,73	89
35	100	1639	68,8	1,75	87
40	100	2098	91,8	1,79	85

Добавка в рацион пищевых желчных кислот, оказывает положительное влияние на продуктивность, сохранность и поедаемость кормов у цыплят-бройлеров. Особенно этот эффект проявляется на финишной стадии кормления.

Однако стоит отметить, что их скармливание лучше начинать с более раннего возраста (16 дней), для предварительной подготовки метаболических процессов в организме.

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**