

***ВНИИФБиП животных - филиал
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста***

**ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА У БЫЧКОВ В МОЛОЧНЫЙ
ПЕРИОД ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РАЗЛИЧНЫХ КОМБИКОРМОВ-СТАРТЕРОВ.**

***Докладчик – научный сотрудник Березин
А.С.***

Таблица 1.

Динамика живой массы и среднесуточного прироста живой массы бычков в первом опыте ($M \pm m$, $n=3$)

Возраст, месяцы	Группы			
	I		II	
	Живая масса, кг	С/с прирост, г	Живая масса, кг	С/с прирост, г
2,5	77,5±3,0	884±88	89,5±1,0	1046±46 +
4,5	140±83	1310±105	141±11	1258±88
5,5	177±10	1041±25	166±14	879±89
за период 1,5-4,5 мес.	62,2±5,3	1111±95	61,2±2,7	1093±85
за период 1,5-5,5 мес.	98,0±6,0	1126±69	86,3±5,3	1037±72

Таблица 2.

Потребление бычками кормов и питательных веществ рационов в возрасте 4.5 месяца

Корма, питательность	Группы		Потреблено к 1-й группе, %
	I	II	
Потреблено кормов			
Сено, г	841±271	615±115	73,0
Комбикорм, г	4090±0	-	-
Горох автоклавированный, г	-	4203±26	-
Добавка минерально-витаминная, г	-	406±444	-

■ Спасибо за внимание!
